

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR (CYBH)

İki insan arasında oluşan cinsel nitelikli (vajinal, oral veya anal cinsel ilişki) yakın temasta bulaşan enfeksiyonlardır.



CYBH her yaşta bireyi etkilemekle birlikte, gençler (15-24 yaş) arasında daha sık gözlenmektedir.

ABD'nde her yıl meydana gelen 20 milyon yeni cinsel yolla bulaşan enfeksiyonun yarısını gençler oluşturmaktadır.

CYBH için risk faktörleri

- Korunmasız cinsel ilişkide bulunan herkes
- Birden çok seks partnerine sahip olanlar
- Cinsel aktiviteler sırasında kondom kullanmayanlar
- Ticari seks işçileri
- Yüksek riskli cinsel davranış uygulama eğilimi gösteren uyuşturucu kullananlar

Bakteriyel Vajinozis En yaygın belirtisi vajinal akıntıdır. Akıntı beyaz/sarı renkte ve balık kokusundadır. İdrar yaparken de yanma olabilir; vajina, ya da her iki dış kısmının etrafında kaşıntı olabilir.

Chlamydia Semptomlar, seks yaptıktan 7-28 gün sonra ortaya çıkabilir. Kadınlarda vajinal akıntı veya kanama, idrar yaparken yanma. Erkeklerde penisten akıntı, idrar yaparken yanma, testislerde şişme

Hep atit B Belirtiler viral temastan 1-9 ay sonra ortaya çıkabilir. Yorgunluk ve sürekli grip benzeri duygular. Sarımsı cilt. Koyu idrar.

Hepatit C Belirtiler viral temastan 1-9 ay sonra ortaya çıkabilir. Yorgunluk ve sürekli grip benzeri duygular. Sarımsı cilt. Koyu idrar.

HPV Bazı tipleri genital bölgede ve anüste kaşıntılı siğillere neden olabilir. Bazı HPV türleri ise hiç belirti vermeyebilir ve rahim ağzı kanserine neden olabilir.

	BULAŞ YOLU			
	Vajinal, oral, anal ilişki	Öpüşme	Kan	Cilt cilde temas
HIV	Red	Green	Red	Green
HSV	Red	Orange	Green	Red
HPV	Red	Green	Green	Green
Gonore	Red	Orange	Red	Green
Klamidya	Red	Green	Red	Green
Sifiliz	Red	Orange	Red	Green
Tricomonas	Red	Green	Red	Green
HBV/HCV	Red	Green	Red	Green
LGV	Red	Green	Red	Green
Ureoplasma	Red	Green	Green	Green
Mycoplasma	Red	Green	Green	Green

Red	Çok riskli
Orange	Orta düzey riskli
Green	Risk yok

HSV 1/2 Semptomlar genellikle cinsel temastan sonra 30 gün içinde görülür. Genital bölge veya ağız mukozasında küçük, ağrılı kabarcıklar 1-3 hafta sürer, tekrarlayabilirler

Gonorrhoea Belsoğukluğu: Belirtiler seks yaptıktan 2-21 gün sonra ortaya çıkabilir. Kadınlarda: Kalın sarı veya gri vajinal akıntı. Anormal periyotlar ve abdominal kramplar. Erkekler: Penisden sarı veya yeşil damla damla. Şişmiş veya ihale edilmiş testisler.

HIV / AIDS Yıllarca belirti olmayabilir. Açıklanamayan kilo kaybı veya yorgunluk, ishal, sürekli grip benzeri bulgular olabilir.

Trichomoniasis Kadınlarda: Vajinada kaşıntı, yanma veya tahriş. Sarı, yeşilimsi veya gri vajinal akıntı. Erkekler: Penisin sulu, beyaz damlası. Yanma veya ağrılı idrar yapma. Sık idrara çıkmamız gerekiyor.

Sifiliz 1. Aşama: Cinsel ilişkiden 1-12 hafta sonra 2-6 hafta süren ağızda veya genital bölgede ağrısız ülserler. 2. Aşama: grip benzeri belirtiler, döküntü, kilo kaybı ve iştahsızlık. Latent evre dediğimiz dönemde; hastalığın belirtileri olmasa da, yapılan testler sonucu hastalığın pozitif olduğu görülür ve bulaşıcıdır.

Lenfograduloma venereum (LGV) Genital bölge veya anüste yumuşak kırmızı, acısız yaralar gözlenir. Geç dönemde lenfadenopatiler, ağrılı idrar yapma, rektal kanama, karında ağrı, pü dolu ve/veya kanlı ishal, ateş, eklem ağrısı ve yorgunluk gözlenebilir.

Ureoplasma urealyticum/parvum Nadiren bulgu verirler.İdrar yaparken yanma ve akıntı

Mycoplasma genitalium Nadiren bulgu verirler.İdrar yaparken yanma ve akıntı

Erkeklerde yaygın CYBH semptomları: Hiç semptom olmayabilir

- Penis, testis veya kasık üzerinde döküntü, leke veya yara
- Akıntı (şeffaf, beyaz veya sarı)
- Ağrılı idrara çıkma
- Ağrısız boşalma
- Penis ucunda kaşıntı
- Boğaz ağrısı
- Ateş
- Kronik grip benzeri semptomlar
- Testislerde ağrı, şişme
- Eklemelerin şişme (dirsek, diz vb.)
- Rektal ağrı veya kanama

Kadınlarda yaygın CYBH Semptomları: Hiç belirti olmayabilir.

- Vajinal akıntı
- Vajinal kaşıntı
- Genital bölge üzerinde döküntü, leke veya yara
- İdrarda yanma
- Ağrılı idrara çıkma
- Cinsel ilişki sırasında ağrı
- Adet döngülerinde değişiklikler
- Vajinadaki ağrısız ülserler
- Pelvik ağrı
- Bel ağrısı
- Ateş
- Mide bulantısı
- Boğaz ağrısı (oral seks sonrası)
- Eklemelerde şişme (diz, dirsek vb.)
- Rektal ağrı, kanama veya akıntı

ÖNEMLİ!!!

CYBH çoğu zaman belirti vermez şüpheli temas sonrası belirti olmasını beklemeyip mutlaka doğru zamanda doğru test yapılmalıdır.

Etken	Test	Ne zaman
HIV	HIV RNA	11-14 gün
	HIV p24	21 gün
	HIV antikor	45 gün
Chlamidya	Chlamidya PCR*	1-5 gün
Gonore	Gonore PCR	2-6 gün
Sifiliz	VDRL, FTA-ABS, RPR, TPHA	3-6 hafta
	HSV PCR*	4-6 hafta
Hepatit B	HBsAg	6 hafta
Hepatit C	AntiHCV	8-9 hafta
Gardnerella vaginalis	Gardnerella vaginalis PCR*	2-6 gün
Trichomonas vaginalis	Trichomonas vaginalis PCR*	2-6 gün
Ureoplasma urealyticum	Ureoplasma urealyticum PCR*	2-6 gün
Mycoplasma genitalium	Mycoplasma genitalium PCR*	2-6 gün

(*) PCR testleri panel olarak toplu halde çalışılmaktadır.

CYBH PANELİ PCR

- [Chlamydia trachomatis](#)
- [Neisseria gonore](#)
- [Gardnerella vaginalis](#)
- [HSV \(herpes simplex 1/2\)](#)
- [Trichomoniasis vaginalis](#)
- [Ureoplasma urealyticum/parvum](#)
- [Mycoplasma genitalium](#)

Numune tipi: Ön idrar

Çalışma zamanı: Salı **Sonuç verme zamanı:** Cuma

İletişim:
Dr. Tutku TAŞKINOĞLU
tutku@duzen.com.tr

www.duzen.com.tr

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTIMIZ

0800 314 73 93

444 D LAB – 444 5 32



DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR (CYBH)



“Güveninizle Tamamlanan 42 Yıl”
“Uluslararası kalite güvenceniz”